

*Statura thalli ut in planta typica, sed differt ab ea nec acidum norsticticum nec acidum salazinicum continente.*

Hab.: among mosses on rocks.

Distr.: Japan and Formosa.

Specim. exam.: Japan. Honsyu. Prov. Suruga: Mt. Huzi, Oomiya-guti, 2-gome (Y. A. in A). Prov. Mikawa: Minami-sitara-gum, Nagasino-mura (M. Mizutani, in A); Mt. Horaizi (S. K. 56014 and 56027, both in K). Prov. Kii: Mt. Koya (April 4, 1956, S. K. 56027—holotype in A and isotype in K and US): Mt. Koya (Y. Numaziri, in M). Prov. Aki: Isl. Ituku-sima (Y. Ikoma 1426, in I). Sikoku. Prov. Tosa: Tosa-gun, Tosayama-mura, Zyo (I. Yoshimura 1163, in K and Y); Agawa-gun, Nanokawa-mura (Nobuhara 725, in Y). Formosa. Taityu-syu (台中州): Keitau (溪頭) (Y. A. in A).

# 〇オオナンバンギセルの白花品 (浅野一男) Kazuo ASANO: A new form of *Aeginetia sinensis*.

純白花のオオナンバンギセルを三信国境の信濃国売木村ブナノネ山の尾根で1958年8月に発見した。ブナノネ山は、標高1000mから1198.8mの頂上まで、広範囲にわたってオオナンバンギセルの生育をみ、その個体数も頗る多い、筆者は1956年より該地の植生調査を行なっているが、今夏はじめて、純白花品の混生していることを知った。

花冠は純白であり、萼は淡黄色である。通常品と異なっており、未記載と思われるので、和名を花色に因んで、シロバナオオナンバンギセルとした。標本は東京大学に納められている。

***Aeginetia sinensis*** G. Beck forma ***albiflora*** Asano, f. nov.

Corollae candidae. Calyces tantum helvi.

Nom. Jap. Shirobana-ōnanbangiseru, nov.

Hab. Hondo: in monte. Bunanone-yama, Urugi-mura, Shimoina-gun, Prov. Shinano. (K. Asano, Aug. 13, 1958: Typus in Herb. Univ. Tokyo.)

(長野県下伊那郡高森北小学校)